

uns des autres, une personne même étrangère aux sciences naturelles les distinguerait à première vue.

Le *Felis ocreata* de Gmelin, longtemps méconnu en raison des prétendus « pinceaux » qu'on attribuait aux oreilles du *Caracal à oreilles blanches* de Buffon, a été l'objet d'un récent travail de M. A.-C. Latorre ⁽¹⁾, qui distingue, dans le Nord de l'Afrique, trois sous-espèces : *F. o. libyca* Meyer (Tunisie), *F. o. mauritana* Latorre (Algérie et Maroc) et *F. o. Marguerittei* Loche (Sahara). Étant donné l'incertitude qui règne encore sur la distinction de ces trois formes, je crois utile de donner la description de la peau rapportée par M. de Kerville :

FELIS OCREATA LIBYCA (*Meyer*). — Dessus *ondé* de gris et de roux clair, les poils roux à la base ayant vers le tiers supérieur un anneau noir et l'extrémité d'un gris presque blanc. Raie dorsale plus foncée; nuque montrant 6 à 8 raies longitudinales très peu distinctes. Face de la couleur de la raie dorsale; oreilles rousses en dehors, blanches en dedans, et sans trace de véritable pinceau. Pattes d'un roux clair en avant, plus foncé en arrière, surtout à l'aisselle, au carpe et au tarse. *Une seule barre noire* en avant des avant-bras, avec une tache blanche au-dessous. Ventre roux clair. Queue de la couleur de la raie dorsale dans sa moitié antérieure, portant dans sa moitié postérieure trois anneaux noirs et trois anneaux gris-clair ou blancs, avec le bout noir. — Longueur : tête et corps, 0 m. 64; queue, 0 m. 33 (sans la touffe terminale). — Le *F. o. mauritana* Latorre aurait sur les pattes des raies plus nombreuses : quatre en avant et six en arrière.

LISTE DES MAMMIFÈRES RAPPORTÉS PAR M. ALLUAUD, DE KHARTOUM
ET DE SHABLUKA HILLS,
PAR M. E.-L. TROUESSART.

La mission de M. Alluaud ne lui permettait pas de chasser les grands Mammifères, mais les espèces de petite taille qu'il a rapportées dans l'alcool sont toutes intéressantes et plusieurs sont des acquisitions nouvelles pour nos collections. En voici la liste :

1. TAPHOZOUS MAURITIANUS E. Geoffroy. — Khartoum.
2. XERUS ERYTHROPUS LEUCOMBRINUS Rüppel. — Khartoum.
3. GERBILLUS PYGARGUS F. Cuvier. — Khartoum.
4. (DIPODILLUS) WATERSI De Winton. — Shabluka Hills.
5. MUS MUSCULUS GENTILIS Brandt. — Khartoum.

⁽¹⁾ A.-C. LATORRE, Mammifères de Mogador (*Bol. Real Soc. Española de Historia natural*, 1906, p. 357-368; *F. o. mauritana*, n. *subsp.*, p. 362).




Fig. 1. — Couagga (*Equus quagga*), d'après la photographie du spécimen conservé dans les galeries du Muséum de Paris. (Espèce éteinte.)